PHASE 3 – COVID-19

Arbre décisionnel de prise en charge d'un patient suspect Covid+ en médecine de ville – 13 mars 2020

Examen médical

Syndrome viral respiratoire haut ou bas

et/ou

Toux

et/ou

Fièvre

et/ou

Céphalée

et/ou

Asthénie

et/ou

Diarrhée

- Toute personne présentant un **SDRA** (syndrome de détresse respiratoire aiguë) dans un contexte possiblement viral et sans autre étiologie évidente d'emblée.
- Toute personne présentant des signes cliniques de **pneumonie aiguë** (grave ou non) sur un terrain fragile présentant au moins **une comorbidité**.

Hospitalisation via Centre 15

Facteurs de Comorbidité +/- :
- ALD, ou maladie chronique (++ Diabète et BPCO, asthme)
- Personnes âgées
- Fumeurs
- Environnement familial et social isolé
- Présence à domicile d'une personne fragile

OUI

Bonne tolérance clinique (Pouls, TA, F respiratoire SaO2 si saturomètre)

NON

NON

OUI

Si <u>aucun</u> facteur de comorbidité et état clinique stabilisé:

- Arrêt de travail 14 jours recommandé
- Remettre fiche de recommandations « Patient adulte à domicile »

- Arrêt de travail 14 jours
- Sous surveillance médicale :

- consultation ou téléconsultation

et/ou

- visite infirmière programmée dans les 4 à 6 jours (aggravations fréquentes en fin de première semaine à compter de la survenue des symptômes)